

23879 TRASTORNS DE LLENGUATGE DE TIPUS SECUNDARI

FEBRER 2005.

Examen tipus Test de 30 preguntes amb respostes alternatives. Model de preguntes:

1. La preferència per paraules complicades, sovint llargues i tècniques. Amb una comprensió inferior a l'expressió i bona iniciativa per les converses es dona sovint en:

1. La síndrome X-fràgil.
2. La síndrome de Williams.
3. La síndrome de Down.
4. 1 i 2 son correctes.

2. Les persones amb la síndrome de Down tenen:

1. Relativament bona adquisició lèxica.
2. Bona discriminació auditiva. i j &
3. Dificultats en la discriminació visual.
4. Facilitat per l'adquisició de regles gramaticals

3. El poc o mal ús de les claus contextuais amb dificultats en l'ús deis articles indeterminats i d'algunes formes pronominals d'economia de la frase, es típica de:

1. La majoria de casos de deficiència mitja i lleugera
2. La síndrome de Down
3. La síndrome X-fràgil
4. Cap resposta es certa

4. Quina de les següents síndromes es caracteritza per una véu especialment aguda en molts casos.

1. La síndrome d'Angelman
2. La síndrome del cromosoma x-fràgil
3. La síndrome de Williams
4. Cap de les anteriors

5. A quina de les següents síndromes es dona pràcticament sempre absència de parla

1. La síndrome d'Angelman
2. La síndrome de Prader-Willi
3. La síndrome de Williams
4. Cap de les anteriors

6. Assenyala la resposta correcta:

1. Els nens amb síndrome de Down tenen bones habilitats comunicatives.
2. La majoria deis nens amb síndrome de Down podrien aprendre a llegir
3. Els nens amb síndrome de Down tenen un perfil d'habilitats millors en l'aspecte visual que auditiu
4. Totes les respostes son certes.

7. A quina de les següents síndromes es freqüent trobar retard en l'adquisició del llenguatge.

1. Síndrome X-fràgil
2. Síndrome Velocardiofacial
3. Síndrome de Williams
4. A totes elles.

8. La hiperactivitat, evitado activa de la mirada, tímidesa però amb interès per la comunicació i estereotípies manuals formen part del fenotip conductual de:

1. Síndrome Angelman N»
2. Síndrome Prader-Willi
3. Síndrome Rett
4. Síndrome X-fràgil