

Guia de bioseguretat per a treballar amb animals

Animals establats

La propagació d'agents infecciosos entre les poblacions d'animals o entre animals i éssers humans es pot prevenir mitjançant l'aplicació de normes bàsiques:

- Cal utilitzar cubetes amb solució desinfectant a l'entrada i a la sortida de les sales contaminades.
- Les portes de les sales o del box d'animal han de romandre tancades en tot moment, excepte quan s'entra o se surt.
- S'han de fer servir guants d'un sol ús sempre que es manipulin animals, llits o gàbies brutes.
- S'ha de fer servir roba exterior d'un sol ús o autoclavable (com ara bates, davantals, etc.) sempre que es manipulin animals.
- Està prohibit menjar, beure, fumar, maquillar-se i fer servir lents de contacte a les sales d'animals.
- Cal evitar de tocar-se amb la mà el nas, els ulls o la boca.
- Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó immediatament després de tocar animals o equips, i abans de sortir de les instal·lacions.
- S'han d'extremar les precaucions quan es manipulin agulles o materials tallants.
- Només s'han de manipular aquelles espècies animals per les quals s'ha rebut una formació específica per prevenir lesions.
- Cal rentar immediatament amb aigua i sabó la superfície afectada per qualsevol mossegada o esgarrapada i demanar atenció mèdica. Comuniquen l'accident o incident al supervisor/a i enregistreu-lo.
- Està prohibida l'entrada als box d'animals a tot el personal sense autorització prèvia. Poden ser necessaris requeriments d'entrada específics depenent del tipus d'estudi en marxa.

Animals salvatges

El treball de camp amb animals salvatges requereix adoptar mesures de prevenció i protecció bàsiques per a cada situació particular. Els animals salvatges poden transmetre potencialment un gran nombre de malalties com ara la ràbia, la síndrome pulmonar per hantavirus, la leptospirosi, la infecció per virus del Nil occidental, la salmonel·losi, la tularèmia o la pesta. També cal considerar el risc d'exposició a malalties transmeses per rosegadors, insectes i artròpodes (ex. arbovirosi). Preneu les precaucions adequades per evitar aquest risc.